

大腸内視鏡検査（大腸カメラ）

を受けられる方へ 様

あなたの検査日時は

月 日 () です。

時 分 に来院して下さい。

※ 検査について

この検査は、内視鏡（カメラ）により大腸の病気や大腸ポリープなどを見つけるために行なう検査です。

大腸の中がきれいになっていないと、検査時間が長くなったり、正確な診断ができない場合があります。

大腸の中をきれいにするためのお薬（モビプレップ）をお出ししますので、指示通りに内服し、ご協力をお願いします。

★血液が固まらないようにする薬（ワーファリン、バイアスピリン、オパルモン等）を内服している方は、事前に医師の指示をご確認ください。

【検査前日】（ / ）

通常の食事をして下さい（なるべく食べてはいけないもの*は控えて）。

【検査当日】（ / ）

*食物繊維の多い野菜、種のある果物、ネギ、海藻、コンニャク、ゴマ、雑穀米

- ① 朝食を食べないで、お薬（モビプレップ）を飲んで下さい。
- ② 検査の4時間前から、モビプレップを飲み始めてください。
（検査が午後1時からの場合は、午前8時より飲み始めて下さい）
※ モビプレップの溶かし方・飲み方については右面をご覧ください。
- ③ 通常、モビプレップを飲み始めてから、約1時間後に排便があります。
- ④ その後、数回（5～8回）にわたって液状の排便があります。
- ⑤ 無色あるいは黄色で透明な水様便になったら服用を終了し、モビプレップの服用量の半量の水又はお茶を必ず飲んでください。
- ⑥ 数回の排便後に少し時間をとり、落ち着いてから来院して下さい。

《薬の溶かし方》

- ① 袋を開封し、バックのキャップを開けて、★の目印まで水を入れて下さい
- ② キャップをしっかりと閉めて、A剤とB剤の隔壁を開通させます。
- ③ バックをよく振り粉末を溶解して下さい。
- ④ 平らな場所に置き、2リットルの目盛りの線までさらに水を入れ、キャップを閉め、よく振り混ぜて完全に溶解して下さい。


《溶液の飲み方》

- ① モビプレップを約200mlのコップに移してください。
- ② 10～15分かけて排泄液が透明になるまでゆっくり服用します。
- ③ モビプレップを約1リットル服用し、水またはお茶をコップ3杯程度（約500ml）同様にゆっくり飲みます。
- ④ 1リットル服用途中で、排泄液が透明になったら服用を終了し、モビプレップ服用量の半量の水またはお茶を必ず飲んでください。
- ⑤ 服薬は、便がほぼ透明な水様便になった場合、またはモビプレップ2リットルと水1リットルを服用した時点で終了です。
- ⑥ 2リットル服用しても排便がない場合は、当院に連絡してください。
- ⑦ モビプレップ服用前後または服用中にも、のどが渇いたときには、がまんせずに水またはお茶を飲んでください。

飲んでもよい水分：水、お茶（前茶、番茶、ウーロン茶、麦茶など）

飲んではいけない水分：スポーツ飲料、乳製飲料（牛乳、飲むヨーグルト）、ジュース類、アルコール類、砂糖や固形物が入っている飲料。

検査当日の予定表



検査につきご不明な点がある場合、ご都合で検査に来られない場合は、ご連絡下さい。

小笠原内科 ☎ 0594-84-2233